

Nazwa:
ACIDOLIT® smak MALINOWY
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Postać:
Proszek, w saszetkach; smak malinowy

Przekaz marketingowy:

Do postępowania dietetycznego w:

Do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie. Acidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

Opis produktu / przeznaczenie:

Acidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

Acidolit® może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych. Zaleca się aby niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonny do alergii podawać Acidolit® w wersji bezsmakowej.

Składniki:

Składniki: glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny

składnik	[mmol/litr]	w 100 g	w 1 saszetce / w [mg/200 ml] roztworu przygotowanego zgodnie z opisem*
Sód	60	6 360 mg	279,84 mg
Chlorki	50	8 180 mg	359,92 mg
Glukoza	85	70 450 mg	3 099,8 mg
Potas	20	3 640 mg	160,16 mg
Cytrynian	10	8 640 mg	380,16 mg
Osmolarność [mOsm/l]	225	-	-

Wartość odżywcza i energetyczna	100 g produktu	1 saszetka / w 200 ml roztworu przygotowanego zgodnie z opisem* /
Wartość energetyczna (energia)	1328 kJ (312 kcal)	58 kJ (14 kcal)
Węglowodany	71 g	3 g
- w tym cukry (glukoza)	71 g	3 g
- skrobia	0,9 g	0 g
Sól (z czego sól)	15,9 g (6,36 g)	0,7 g (0,28 g)

Sposób użycia:

Sposób przygotowania:

Do 200 ml przygotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Porcja preparatu Acidolit® proponowana do spożycia:

Waga dziecka	Ilość płynu
Do 4 kg	50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
4 – 8 kg	50 ml – 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
8 – 12 kg	100 ml – 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Powyżej 12 kg	100 ml– 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
---------------	---

Ważna informacja:

Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza.

Produkt jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Zawiera znikome ilości tłuszczu, błonnika i białka.

Ostrzeżenia:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Dostępne wielkości opakowań:

10 saszetek po 4,4 g

Podmiot odpowiedzialny za informację o produkcie:

Z.F. POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański